


[Contact](#)
[Webwinkel](#)
[Bibliotheek](#)

SOVON organiseert  
landelijke vogelstellingen  
ten behoeve van mede  
belang en onderzoek.

[SOVON](#)
[Monitoring](#)
[Onderzoek](#)
[Producten en diensten](#)
[Publicaties](#)
[Links](#)
[Home](#) > [Monitoring](#) > [Inventarisatierichtlijnen](#)

## Monitoring

[Projectenoverzicht](#)
[Inventarisatierichtlijnen](#)
[→](#) [Waarom richtlijnen](#)
[Broedvogels](#)
[Winter- en trekvogels](#)
[Herkenning exoten](#)
[Reproductie & overleving](#)
[Vogel- en zoogdiersterfte](#)

Zoek met Google  
in de SOVON-site:

Kies een soort:



**Huismus**

*Passer domesticus*

**Methode**

Territoriumkartering

**Tijd van het jaar**

Begin maart t/m half juni

**Datumgrenzen**

10 maart t/m 20 juni.

**Tijd van de dag**

Gehele dag, met voorkeur voor de (vroeg) ochtend.

**Aanwijzingen**

Zingende mannetjes (veelal op dakrand), paren (bij potentiële nestplaats) en aanwijzingen voor nest: nestbouw, bezoek aan waarschijnlijke nestplaats (nest zelf vaak niet zichtbaar, maar grasspriet of veertjes steken uit), transport van voedsel of ontlastingspakketjes, bedelende jongen in nest (vlak voor uitvliegen goed te horen, steken kopjes uit nestopening). Waarnemingen zoveel mogelijk per huisadres noteren of anders per huizenblok, en maak onderscheid tussen de geslachten. Bij hoge dichtheden (tegenwoordig ongewoon), als gespecificeerde telling onmogelijk is, aantal turven en hoogste aantal (voor 15 mei) delen door 1,5.

LET OP: Beste tijd is vóór half mei, daarna vliegen jongen van eerste legsel uit. Telling in stedelijk gebied bij voorkeur op zondagochtend (rustig). Indien mogelijk de achterkant van huizen eveneens controleren (vanaf steegje enz.), maar respecteer de privacy van de bewoners! Tellen bij boerderijen of andere geïsoleerde gebouwen in dit opzicht eveneens soms lastig; vraag toestemming tot betreding van erf of zoek vanaf openbare weg met de kijker daken van stallen en huizen af op mannetjes. Oppassen met verwarring tussen broedplek en favoriete foerageerplek. In stedelijk gebied vaak hoge dichtheden bij stadsboerderijen, maneges en dierentuinen, maar zulke plekken zijn ook in trek om te foerageren en trekken vogels uit de omgeving aan (ga dus vooral uit van zingende vogels en nestaanwijzingen).

Traditionele nestplaatsen liggen onder dakpannen ('ouderwetse' oranje pannen) en in spouwmuren enz., maar er wordt ook gebroed in nesten van andere vogelsoorten (Ooievaar, Huiszwaluw), kunstmatige nestgelegenheden (voor Gierzwaluw, Spreeuw en Huismus), in klimop tegen huizen en onverwachte plekken (straatverlichting, bouwmachines). Nesten, indien zichtbaar, onmiskenbaar: rommelig, met veel strootjes en veren. In stallen vaak gemakkelijk zichtbaar (in de spanten).

**Interpretatie**

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult mannetje in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts: moet er 1 waarneming zijn in de periode 10 maart t/m 20 juni

**Fusieafstand**

100 m

**Bijzonderheden**

In verband met het veelvuldig voorkomen van overtredingen van de Flora & Faunawet (bij sloop, renovatie, onderhoudswerkzaamheden) is DLG (Dienst Landelijk Gebied) bezig om een Soortenstandaard voor de Huismus op te stellen (verschijnt in de loop van het voorjaar 2011). Hierin staat informatie over de soort, leefwijze en aanwijzingen voor mitigerende en compenserende maatregelen.

**Broedbiologie**

Broedt bijna altijd in losvaste kolonies en steevast in directe omgeving van menselijke bewoning, van steden tot geïsoleerde gebouwen (boerderijen, kastelen enz.). Eileg van eind maart tot begin april, met tamelijk synchrone eerste legplek in tweede helft april/begin mei. Twee tot drie (soms vier) broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 11-12 dagen, nestjongenperiode rond 17 dagen, uitgevlogen jongen worden 1-2 weken gevoerd.



**Dov**  
deze  
PD

alle:  
PD

**Fotc**  
Soor  
Terr  
gedr

[↑](#) Naar boven

[Oproepen-RSS](#) | [Nieuws-RSS](#) | [Wat is RSS?](#) | [Disclaimer](#) |